

**1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS**  
Pascoleucyn® Tabletten  
Homöopathisches Arzneimittel bei Erkältungs-  
krankheiten

**2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZUSAMMENSETZUNG**

1 Tablette enthält:  
Wirkstoffe:  
Baptisia (HAB 1934) Trit. D4  
(HAB, V. 3a) 16 mg  
Bryonia Trit. D1 16 mg  
Eupatorium perfoliatum Trit. D2 16 mg  
Thuja Trit. D4 16 mg  
Lachesis Trit. D8 16 mg

Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat.  
Vollständige Auflistung der sonstigen  
Bestandteile siehe Abschnitt 6.1.

**3. DARREICHUNGSFORM**  
Tabletten

**4. KLINISCHE ANGABEN**

**4.1 Anwendungsgebiete**  
Die Anwendungsgebiete leiten sich von den  
homöopathischen Arzneimittelbildern ab.  
Dazu gehören: Erkältungskrankheiten.

**4.2 Dosierung und Art der Anwendung**  
Dosierung:  
Soweit nicht anders verordnet:  
Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:  
Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze  
Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 1 Tablette  
im Munde zergehen lassen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1 bis 3-mal  
täglich je 1 Tablette im Munde zergehen  
lassen.  
Bei Besserung der Beschwerden ist die  
Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

**Dauer der Anwendung**  
Eine über eine Woche hinausgehende An-  
wendung sollte nur nach Rücksprache mit  
einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten  
erfolgen.  
Auch homöopathische Arzneimittel nicht  
über längere Zeit ohne ärztlichen Rat  
einsetzen.

**4.3 Gegenanzeigen**  
Überempfindlichkeit gegen Eupatorium  
perfoliatum (Wasserdost), einen der  
Wirkstoffe oder gegen andere Korbblütler  
oder gegen einen der in Abschnitt 6.1  
genannten sonstigen Bestandteile.  
Siehe auch unter „Vorsichtsmaßnahmen für  
die Anwendung und Warnhinweise“.

**4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichts-  
maßnahmen für die Anwendung**  
Der Patient wird in der Packungsbeilage  
darauf hingewiesen, bei Fieber über 39 °C,  
blutigem oder eitrigem Auswurf oder Atem-  
not einen Arzt aufzusuchen.

Patienten mit der seltenen hereditären  
Galactose-Intoleranz, Lactase-Mangel oder  
Glucose-Galactose-Malabsorption sollten  
Pascoleucyn® Tabletten nicht einnehmen.

**Kindern**  
Zur Anwendung des Arzneimittels bei  
Kindern liegen keine ausreichend doku-  
mentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb  
bei Kindern unter 12 Jahren nicht ange-  
wendet werden.

**4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-  
mitteln und sonstige Wechselwirkungen**

Keine bekannt.  
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines  
homöopathischen Arzneimittels kann durch  
allgemein schädigende Faktoren in der  
Lebensweise und durch Reiz- und Genuss-  
mittel (z.B. Nicotin, Alkohol, Kaffee) ungünstig  
beeinflusst werden.

**4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit**

Der Patient wird auf Folgendes hingewiesen:  
Da keine ausreichend dokumentierten  
Erfahrungen zur Anwendung in der  
Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen,  
sollte das Arzneimittel nur nach Rück-  
sprache mit dem Arzt eingenommen werden.  
Untersuchungen zur Beeinflussung der  
Fertilität liegen nicht vor.

**4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtig-  
keit und die Fähigkeit zum Bedienen von  
Maschinen**

Keine bekannt, aufgrund der wirksamen  
Bestandteile auch nicht zu erwarten.

**4.8 Nebenwirkungen**

Keine bekannt.  
Der Patient liest in der Packungsbeilage:  
Hinweis: Bei der Einnahme eines  
homöopathischen Arzneimittels können sich  
die vorhandenen Beschwerden vorübergehend  
verschlimmern (Erstverschlimmerung). In  
diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel  
absetzen und Ihren Arzt befragen.

**Meldung des Verdachts auf  
Nebenwirkungen**

Die Meldung des Verdachts auf  
Nebenwirkungen nach der Zulassung ist von  
großer Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine  
kontinuierliche Überwachung des Nutzen-  
Risiko-Verhältnisses des Arzneimittels.  
Angehörige von Gesundheitsberufen sind  
aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer  
Nebenwirkung dem Bundesinstitut für  
Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt.  
Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger  
Allee 3, D-53175 Bonn, Website:  
www.bfarm.de anzuzeigen.

**4.9 Überdosierung**  
Intoxikationen mit Pascoleucyn® Tabletten sind  
nicht bekannt und auch aufgrund der  
arzneilich wirksamen Bestandteile nicht zu  
erwarten.

**5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN**  
Entfällt.

**6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN**

**6.1 Liste der sonstigen Bestandteile**  
Lactose-Monohydrat, Maisstärke, Magnesium-  
stearat (pflanzlich).

**6.2 Inkompatibilitäten**  
Nicht zutreffend.

**6.3 Dauer der Haltbarkeit**  
5 Jahre.

**6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die  
Aufbewahrung**  
Nicht über 25 °C aufbewahren.

**6.5 Art und Inhalt des Behältnisses**  
Originalpackung mit  
100 Tabletten (N1)  
Musterpackung mit  
20 Tabletten

**6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die  
Beseitigung**  
Keine besonderen Anforderungen.

**7. INHABER DER ZULASSUNG**  
Pascoe  
pharmazeutische Präparate GmbH  
Schiffenberger Weg 55  
D-35394 Giessen  
bzw. Großempfängerpostleitzahl  
D-35383 Giessen  
Telefon +49 (0)641/79 60-0  
Telefax +49 (0)641/79 60-1 09  
Internet: www.pascoe.de  
E-Mail: info@pascoe.de

**8. ZULASSUNGSNUMMER**  
6736126.00.00

**9. DATUM DER ERTEILUNG DER  
VERLÄNGERUNG DER ZULASSUNG**  
02.02.2007

**10. STAND DER INFORMATION**  
07/2018

**11. VERKAUFSABGRENZUNG**  
Apothekenpflichtig.