

**1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS**  
Gripps® SL Tropfen  
Homöopathisches Arzneimittel bei Erkältungskrankheiten

**2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZUSAMMENSETZUNG**

10 g (= 10,6 ml) enthalten:  
Wirkstoffe:

Eucalyptus Ø	200 mg
Kalium bichromicum Dil. D2	100 mg
Eupatorium perfoliatum Ø	25 mg
Gelsemium Dil. D1	10 mg
Arsenicum album Dil. D3	10 mg
Nux vomica Ø	10 mg
Phosphorus Dil. D3	10 mg
Sabadilla Ø	10 mg
Bryonia Dil. D1	10 mg
Aconitum Dil. D1	10 mg
Sanguinaria Dil. D6	5 mg

1 g entspricht 43 Tropfen.

Enthält 43 Vol.-% Alkohol.

Vollständige Auflistung der sonstigen Bestandteile siehe Abschnitt 6.1.

**3. DARREICHUNGSFORM**

Mischung

**4. KLINISCHE ANGABEN**

**4.1 Anwendungsgebiete**

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Erkältungskrankheiten.

**4.2 Dosierung und Art der Anwendung**

Dosierung:

Soweit nicht anders verordnet:

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Kinder von 1-12 Jahren:

Kleinkinder zwischen dem 1. und 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenenendosis.

Es wird empfohlen, das Arzneimittel bei Kindern mit etwas Wasser verdünnt anzuwenden.

**Dauer der Anwendung**

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen bzw. medizinischen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

**4.3 Gegenanzeigen**

Alkoholranke.

Überempfindlichkeit gegen einen der Wirkstoffe, insbesondere Chrom, Eucalyptus, Cineol oder gegen einen der in Abschnitt 6.1. genannten sonstigen Bestandteile.

**4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung**

In der Packungsbeilage wird der Patient auf Folgendes hingewiesen: Bei Fieber über 39 °C, blutigem oder eitrigem Auswurf oder Atemnot ist ein Arzt aufzusuchen.

**Kinder:**

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern unter 1 Jahr liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Säuglingen nicht angewendet werden.

**4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen**

Keine bekannt

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel (z.B. Nikotin, Alkohol, Kaffee) ungünstig beeinflusst werden.

In der Packungsbeilage wird der Patient auf Folgendes hingewiesen: Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/ anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/ angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

**4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit**

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, wird dem Patienten empfohlen, Gripps® SL Tropfen in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt einzunehmen. Untersuchungen zur Beeinflussung der Fertilität liegen nicht vor.

**4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

**4.8 Nebenwirkungen**

In einzelnen Fällen können Hautreaktionen auftreten, das Mittel ist dann abzusetzen.

Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

In der Packungsbeilage wird der Patient auf Folgendes hingewiesen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

**Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen**

Die Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen nach der Zulassung ist von großer Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses des Arzneimittels. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung dem Bundesinstitut für

Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzuzeigen.

**4.9 Überdosierung**

Intoxikationen mit Gripps® SL Tropfen sind nicht bekannt und auch aufgrund der arzneilich wirksamen Bestandteile nicht zu erwarten.

**5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN**  
Entfällt.

**6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN**

**6.1 Liste der sonstigen Bestandteile**

Ethanol 86 % (m/m), Gereinigtes Wasser

**6.2 Inkompatibilitäten**

Nicht zutreffend.

**6.3 Dauer der Haltbarkeit**

5 Jahre

Dieses Arzneimittel soll nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr eingenommen werden.

**6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung**

Nicht über 25 °C aufbewahren.

**6.5 Art und Inhalt des Behältnisses**

Originalpackungen mit

20 ml Mischung (N1)

50 ml Mischung (N1)

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

**6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung**

Keine besonderen Anforderungen.

**7. INHABER DER ZULASSUNG**

Pascoe

pharmazeutische Präparate GmbH

Schiffenberger Weg 55

D-35394 Gießen

bzw. Großempfängerpostleitzahl

D-35383 Gießen

Telefon +49 (0)641/79 60-0

Telefax +49 (0)641/79 60-109

Internet: [www.pascoe.de](http://www.pascoe.de)

E-Mail: [info@pascoe.de](mailto:info@pascoe.de)



# Gripps® SL Tropfen

---

**8. ZULASSUNGSNUMMER**

Zul.-Nr.: 6740286.00.00

**9. DATUM DER ERTEILUNG DER VER-  
LÄNGERUNG DER ZULASSUNG**

08.11.2006

**10. STAND DER INFORMATION**

06/2018

**11. VERKAUFSABGRENZUNG**

Apothekenpflichtig.